Onde os Ratos Silvestres Podem Aparecer?



Ao redor das casas, principalmente de áreas rurais, onde exista lixo, entulho, pilhas de lenhas, produtos agrícolas, palhas, ração animal.



Nas plantações, principalmente de grãos como milho, arroz, cana-deaçúcar, soja.



Em locais onde são armazenados grãos, dentro ou fora de casa em áreas rurais, e que estejam ao alcance dos roedores.



Em áreas desmatadas, onde casas e alojamentos são construídos a menos de 50 metros da mata e plantações.



Em depósitos de grãos no campo.



Em acampamentos, nas matas, campos, beira de represas, lagos e rios.





VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Vigilância Sanitária

(65) 99999-1824 e (65) 99661-9423

Rua Bahia N° 899 - Bairro: Centro Campo Novo do Parecis-MT

Vigilância Epidemiológica (65) 99985-8015

Rua Bahia N° 899 - Bairro: Centro Campo Novo do Parecis-MT

Vigilância Ambiental (65) 99981-5350

Av. Mato Grosso, N° 206 NE - Bairro: Centro Campo Novo do Parecis-MT









A Única Forma de Evitar a Doença é a PREVENÇÃO!

HANTAVIROSE






o que é Hantavirose?

A Hantavirose é uma doença causada por um vírus encontrado em ratos silvestres, que vivem nas áreas rurais.



Evite contato com esses animais

A transmissão/contaminação ocorre quando a pessoa respira a poeira com partículas de excrementos, formados a partir da urina, fezes e saliva de ratos silvestres contaminados, ao varrer ou entrar em ambientes com alta presença de ratos.



Quais os Principais Sintomas?

- · Febre alta;
- · Cansaço;
- Dor no corpo;
- Dor de cabeça;
- Dor na barriga;
- Enjôos e vômitos;
- · Dificuldade para respirar;
- · Tosse seca.

A Melhor Forma de Evitar a Doença é a Prevenção!

É muito simples prevenir!

Ao entrar em depósitos e silos de armazenamento, fazer manutenção e limpeza de máquinas agrícolas, trabalhar na lavoura: use máscara de biossegurança P3 e luvas.







Para Impedir que os Ratos Silvestres Invadam o seu Espaço é Fácil:

- Mantenha Sua casa limpa;
- · Não deixe a casa fechada por muito tempo;
- Não deixe restos de comida ou ração ao alcance dos ratos;
- Guarde bem os grãos a uma altura mínima de 40cm do chão;





- Não coma frutos caídos ou próximos do chão;
- Jogue restos de alimentos no lixo e tape-os. Não deixe o lixo espalhado;
- · Não guarde entulhos;
- Tampe qualquer lugar que possa servir de abrigo ao rato;

- Não plante nada a menos de 50 metros de sua casa;
- Mantenha o mato em volta da casa sempre cortado;
- As realizar limpeza e descontaminação de locais prováveis de infecção, sempre usar equipamento de proteção de biossegurança 3(máscara PFF3);





- A limpeza dos ambientes deve ser realizada com uma solução preparada com água e água sanitária a 10% para desinfetar 06 locais (09 litros de água e 01 litro de água sanitária);
- Preserve os predadores naturais do rato silvestre, como: corujas, gaviões, cobras não venenosas e gatos;
- Somente levar para a sede da fazenda ou cidade os equipamentos e maquinários da fazenda limpos.







Se você esteve em local de risco(área rural) nos últimos 60 dias e sentir os primeiros sintomas da doença, procure imediatamente o posto de saúde mais próximo de sua casa.